

Nicorette Classic 4mg guma do żucia x 105 szt.



Cena: 74,99 zł

Opis słownikowy

Producent	MCNEIL AB
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Guma do żucia

Dawka

4 mg

Opakowanie

105 sztuk

Skład

Jedna kostka gumy Nicorette zawiera 4 mg nikotyny w postaci kompleksu żywicy nikotynowej 20% oraz substancje pomocnicze: bezwodny węglan sodu, guma bazowa, sorbitol proszek, aromat smakowy ZD-49284, aromat smakowy 83.6422, gliceryna 85%, zółcień chinolowa.

Działanie

Gdy pacjent zaprzestaje palenia papierosów i nikotyna przestaje być regularnie dostarczana do organizmu, zaczynają się pojawiać różne objawy wynikające z odstawienia nikotyny, między innymi drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia snu. Za pomocą gumy Nicorette można im zapobiec lub je osłabić dostarczając do organizmu w krótkim czasie niewielkie dawki nikotyny.



Uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu

Dawkowanie

Bez zalecenia lekarza nie stosować u osób poniżej 18 roku życia. Wstępna dawka powinna zostać dobrana indywidualnie w zależności od stopnia uzależnienia od nikotyny. Zazwyczaj stosuje się 8-12 gum o odpowiedniej zawartości nikotyny na dobę. Osoby palące o niskim stopniu uzależnienia (Test Fagerstroma uzależnienia

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu

Działania niepożądane

Większość objawów niepożądanych występuje w ciągu pierwszych 3-4 tygodni po rozpoczęciu leczenia. Podczas pierwszych dni stosowania najczęściej zgłasza się podrażnienie gardła oraz zwiększone wydzielanie śliny. Nadmierne połykanie uwolnionej nikotyny może początkowo powodować czkawkę. Wymienione działania niepożądane ustępują zwykle po kilku dniach leczenia. Jeżeli występują nadal należy skonsultować się z lekarzem. Do innych objawów niepożądanych należą:

- bardzo często: bóle głowy, uczucie dyskomfortu, czkawka,
- często: zawroty głowy, nudności, wymioty,
- niezbyt często: kołatanie serca, rumień pokrzywka,
- rzadko i bardzo rzadko: przejściowe migotanie przedsionków, bóle jamy ustnej i gardła, bóle mięśni żuchwy, reakcje alergiczne w tym obrzęk naczynioruchowy.

U niektórych osób mogą wystąpić inne objawy niepożądane niewymienione wyżej. W takim przypadku należy zasięgnąć porady lekarza.

Uwagi

Przed zastosowaniem w ciąży i okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza.